TYPHUS À POUX *(suite)*
LOUSE-BORNE TYPHUS FEVER *(contd.)*

Amérique — America

		C	D
BOLIVIE — BOLIVIA		29.VIII	
Potosi, Dep.			
Quijarro, Prov.			
Pulacayo, Can. . . .		5	...
ÉQUATEUR — ECUADOR			
Chimborazo, Province			
Alausi, Canton			
Tixan, Parr.	13-19.VIII	1	0
Riobamba, Canton			
Riobamba, Parr. . . .	6-12.VIII	1	0
Pichincha, Province			
Quito, Canton			
Santo Domingo, Parr.	16-22.VII	1	0
MEXIQUE [1] — MEXICO [1]	25.VI-19.VIII		
Mexico, State			
Atlacomulco, Municipio			
San Francisco Chalchihuapan . .		26	3

[1] Voir *Inf. épidém.* ci-dessous/See *Epidem. Notes* below.

Europe

YOUGOSLAVIE — YUGOSLAVIA			
BOSNIE & HERZÉGOVINE			
Districts			
Tuzla, Zenica	□ 20.VIII		

FIÈVRE RÉCURRENTE À POUX
LOUSE-BORNE RELAPSING FEVER

Afrique — Africa

	C
ÉTHIOPIE — ETHIOPIA	6-12.VIII
Addis Ababa (A) . .	4
Provinces	
Arusi	5
Bale	7
Kaffa	5
Shoa (excl. Addis Ababa (A))	33
Wollega	14

INFORMATIONS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

VARIOLE

Afrique

Tchad. — Des cas non-importés de variole ont été signalés au Tchad, dans la Préfecture du Lac, pour la semaine terminée le 1er juillet. Le Tchad était indemne de variole depuis le 8 octobre 1965. Il a été établi que l'infection provenait du Nigéria du Nord. 81 cas non-importés et 21 décès ont été observés dans la Préfecture du Lac jusqu'au 29 juillet (rapport pour la semaine terminée à cette date).

Depuis le début de l'épidémie, 140 000 vaccinations ont été faites dans cette Préfecture et dans les Préfectures voisines de Kanem et Chari-Baguirmi.

L'ensemble du Tchad est mentionné dans le présent *Relevé* comme redevenu indemne de variole, aucun nouveau cas n'ayant été signalé pendant plus de quatre semaines.

TYPHUS

Amérique

Mexique. — Dans une communication envoyée par poste aérienne le 31 août, l'administration sanitaire a rapporté une épidémie de typhus à poux, confirmée par le laboratoire, à San Francisco Chalchihuapan, Municipio d'Atlacomulco, Etat de Mexico.

Entre le 25 juin et le 19 août, 26 cas (3 décès) sont survenus chez des personnes (16 du sexe féminin) âgées de 18 mois à 45 ans.

Les malades ont été traités au chloramphénicol; le DDT a été utilisé pour les malades et leurs contacts.

EPIDEMIOLOGICAL NOTES

SMALLPOX

Africa

Chad. — For the first time since 8 October 1965 non-imported cases of smallpox were reported in Chad during the week ending 1 July. The cases were in *Préfecture du Lac* and the infection was determined to have originated in Northern Nigeria. Until the week ending 29 July, 81 local cases with 21 deaths were reported in *Préfecture du Lac.*

Since the beginning of the outbreak more than 140 000 smallpox vaccinations were done in *Préfecture du Lac* and the neighbouring Prefectures of Kanem and Chari-Baguirmi.

After more than four weeks without any new cases Chad is shown in this issue of the *Record* as once again free of smallpox.

TYPHUS

America

Mexico. — In an airmail notification dated 31 August the health administration reported an outbreak of louse-borne typhus, confirmed by laboratory, in San Francisco Chalchihuapan, Atlacomulco Municipio, State of Mexico.

Between 25 June and 19 August, 26 cases with 3 deaths occurred; 16 were female, and ages involved were from one-and-a-half to 45.

Patients were treated with chloramphenicol and DDT was used for patients and their contacts.